

レジメン名	BV(15mg/kg)+PEM(500mg/m ²)+CDDP(75mg/m ²) 3週		
対象癌種	非小細胞肺がん		
1コースの期間	21日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL デキサート注6.6mg/2mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1V 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1	
2	アクメインD輸液500mL 硫酸Mg補正液1mEq/1mL	1Bag 4mL	点滴静注	1時間30分で	day1	
3	20%マンニトール注射液300mL	1Bag	点滴静注	30分で	day1	
4	生理食塩液100mL ○ベバシズマブ点滴静注	1本 15mg/kg	点滴静注	1時間30分で	day1	
5	生理食塩液100mL ○ペメトレキセド注射用	1本 500mg/m ²	点滴静注	10分で	day1	
6	生理食塩液250mL ○シスプラチン点滴静注	1Bag 75mg/m ²	点滴静注	1時間30分で	day1	遮光袋
7	生理食塩液1000mL	1Bag	点滴静注	3時間で	day1	
8	アクメインD輸液500mL 硫酸Mg補正液1mEq/1mL	1Bag 4mL	点滴静注	1時間30分で	day1	
9	へパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	1本	静脈注射	側管で	day1,2	
10	生理食塩液50mL デキサート注6.6mg/2mL	1本 1V	点滴静注	全開で	day1,2	
11	生理食塩液1000mL	1Bag	点滴静注	3時間で	day1,2	
12	アクメインD輸液500mL	1Bag	点滴静注	1時間30分で	day1,2	

その他(減量基準・特記事項など)

コメント1:RP4 2回目60分、3回目以降30分

変更点(2020/12/02)

- ・制吐剤混合:手技簡略、血管痛予防
- ・ラシックス削除
- ・ヘパリンロックの追加 day1

20210520 ソリューゲンG注→アクメインD輸液500mL

20210520 ヘパリンNaロック用100単位/mL→ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL