

レジメン名	サイラムザ(10mg/kg)+DOC(60mg/m <sup>2</sup> ) 3週		
対象癌種	非小細胞がん		
1コースの期間	21日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	グラニセトロン点滴静注パック3mg/100mL デキサート注6.6mg/2mL ポララミン注5mg/1mL	1Bag 1V 1A	点滴静注	全開で	day1	インラインフィルター
2	生理食塩液100mL	1本	点滴静注	30分で	day1	インラインフィルター
3	生理食塩液250mL ○サイラムザ点滴静注	1Bag 10mg/kg	点滴静注	1時間で	day1	インラインフィルター
4	5%ブドウ糖注射液250mL ○ドセタキセル点滴静注	1Bag 60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間で	day1	
5	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	

その他(減量基準・特記事項など)

変更点(2020/10/13)

①レスタミン内服→ポララミン

ポララミンはInfusion reaction軽減のために使用。サイラムザ投与時Infusion reactionの観察必要。

②infusion リアクション観察は2日目以降も注意必要

※催吐リスク中等度で対応。

③コメントRP3:初回60分、2回目以降30分可