

レジメン名	Atezolizumab+BV(15mg/kg)+PTX(200mg/m ²)+CBDCA(AUC6)		
対象癌種	非小細胞肺癌		
1コースの期間	21日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルート確保	day1	インラインフィルター
2	生理食塩液250mL ○テセントリク点滴静注用	1Bag 1200mg/m ²	点滴静注	1時間で	day1	インラインフィルター
3	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	インラインフィルター
4	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL ポラミン注5mg/1mL ファモチジン注20mg 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1A 1A 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1	
5	生理食塩液100mL ○ベバシズマブ点滴静注	1本 15mg/kg	点滴静注	1時間30分で	day1	
6	5%ブドウ糖注射液500mL ○パクリタキセル点滴静注	1Bag 200mg/m ²	点滴静注	3時間で	day1	
7	5%ブドウ糖注射液250mL ○カルボプラチン点滴静注	1Bag AUC6	点滴静注	1時間で	day1	インラインフィルター
8	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	

その他(減量基準・特記事項など)

コメント:パクリタキセル投与30分前にレスタミンコーワ錠10mg5錠 内服→削除を

コメント1 RP2:初回60分、忍容性があれば2回目以降30分

コメント:Rp6 忍容性があれば、2回目60分、3回目以降30分

変更点201202

プロイメント単独にデキサート入りへ