

レジメン名	FOLFIRI 2週		
対象癌種	大腸がん		
1コースの期間	14日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	グラニセロン点滴静注パック3mg/100mL デキサート注6.6mg/2mL	1Bag 1V	点滴静注	30分で	day1	
2	5%ブドウ糖注射液250mL ○レボホリナート点滴静注用	1Bag 200mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
3	5%ブドウ糖注射液250mL ○イリノテカン点滴静注用	1Bag 150mg/m2	点滴静注	1.5時間で	day1	
4	生理食塩液100mL ○フルオロウラシル注	1本 400mg/m2	点滴静注	全開	day1	
5	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	
6	生理食塩液100mL ○フルオロウラシル注	1本 2400mg/m2	点滴静注	46時間で	day1	トレフューザーポンプ

その他(減量基準・特記事項など)

コメント1:RP2 側管、グラニセロンパックと並列で同時投与

コメント2:RP6 インフューザーポンプ(2.5mL/h)で

コメント3:RP3: グラニセロン終了後、レボホリナートと並列投与

○変更(2020/10/28)

①デキサート9.9mg→6.6mgに(中等度)

②イリノテカンの溶解液:1号液→5%Tzに変更

③5FUの側管投与の中止

④5FU後の生食追加(ルートフラッシュ用)

○変更(2022/08/24)

コメント3追加