

レジメン名	MMC+フルオロウラシル+RT療法		
対象癌種	肛門がん		
1コースの期間	28日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液50mL デキサート注6.6mg/2mL	1本 1V	点滴静注	全開で	day1	
2	○マイトマイシン注用2mg 注射用蒸留水20mL 生理食塩液100mL	10mg/m2 3本 1本	点滴静注	全開で	day1	
3	生理食塩液1000mL ○フルオロウラシル注	1Bag 1000mg/m2	点滴静注	24時間で	day1	
4	生理食塩液1000mL ○フルオロウラシル注	1Bag 1000mg/m2	点滴静注	24時間で	day2	
5	生理食塩液1000mL ○フルオロウラシル注	1Bag 1000mg/m2	点滴静注	24時間で	day3	
6	生理食塩液1000mL ○フルオロウラシル注	1Bag 1000mg/m2	点滴静注	24時間で	day4	
7	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で	day4	

その他(減量基準・特記事項など)

コメント:RP2 マイトマイシン1Vを蒸留水5mLで溶解。

蒸留水は必要分のみ使用

変更点 201202

・RP1 投与時間変更 15分で→全開で