

レジメン名	肛門癌FP：フルオロウラシル(1000mg/m ² day1-4)+CDDP(75mg/m ² day1)+RT 4週		
対象癌種	局所肛門癌		
1コースの期間	28日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL デキサート注6.6mg/2mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1V 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1	
2	アクメインD輸液500mL 硫酸Mg補正液1mEq/1mL	1Bag 8mL	点滴静注	1時間で	day1	
3	20%マンニトール注射液300mL	1Bag	点滴静注	30分で	day1	
4	生理食塩液250mL ○シスプラチン点滴静注	1Bag 75mg/m ²	点滴静注	2時間で	day1	遮光袋
5	ソリューゲンF輸液500mL	1Bag	点滴静注	1時間で	day1	
6	アクメインD輸液500mL	1Bag	点滴静注	1時間で	day1	
7	生理食塩液1000mL ○フルオロウラシル注	1Bag 1000mg/m ²	点滴静注	24時間で	day1	
8	生理食塩液50mL デキサート注6.6mg/2mL	1本 1V	点滴静注	全開で	day2-3	
9	生理食塩液1000mL ○フルオロウラシル注	1Bag 1000mg/m ²	点滴静注	24時間で	day2-4	
10	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day4	

その他(減量基準・特記事項など)

コメント:フルオロウラシル (42mL/h)で持続,補液は経過を見て追加。