

レジメン名	mFOLFIRINOX 2週 (IRI:150mg/m ²)		
対象癌種	膵がん		
1コースの期間	14日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL デキサート注6.6mg/2mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1V 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1	
2	5%ブドウ糖注射液250mL ○オキサリプラチン点滴静注液	1Bag 85mg/m ²	点滴静注	2時間で	day1	
3	5%ブドウ糖注射液100mL	1本	点滴静注	30分で	day1	
4	5%ブドウ糖注射液250mL ○レボホリナート点滴静注用	1Bag 200mg/m ²	点滴静注	2時間で	day1	
5	生理食塩液250mL ○イリノテカン点滴静注	1Bag 150mg/m ²	点滴静注	1.5時間で	day1	
6	生理食塩液100mL ○フルオロウラシル注	1本 2400mg/m ²	点滴静注	46時間	day1	トレフューザーポンプ

その他(減量基準・特記事項など)

コメント1:RP3 側管、イリノテカンと並列で同時投与

○変更(2020/8/3)

①イリノテカンの投与時間は1.5時間→2時間(投与順の統一のため)

○変更(2022/8/24)

①イリノテカンの投与時間再変更 1.5時間へ(臨床試験に合わせた)

②RP4の糖液追加。①の繋ぎのため

③コメント変更

RP4:レボホリナートと同時に 30分投与後残薬破棄

RP5:糖液と同時に開始、糖液終了時イリノテカンと並列

RP6:糖液終了後、レボホリナートと同時に