

レジメン名	FP : CDDP(80mg/m ² day1)+フルオロウラシル(800mg/m ² day1-5) 3週		
対象癌種	食道癌		
1コースの期間	21日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL デキサート注6.6mg/2mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1V 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1	
2	アクメインD輸液500mL 硫酸Mg補正液1mEq/1mL	1Bag 8mL	点滴静注	1時間で	day1	
3	20%マンニトール注射液300mL	1Bag	点滴静注	30分で	day1	
4	生理食塩液250mL ○シスプラチン点滴静注	1Bag 80mg/m ²	点滴静注	2時間で	day1	遮光袋
5	ソリューゲンF輸液500mL	1Bag	点滴静注	1時間で	day1	
6	アクメインD輸液500mL	1Bag	点滴静注	1時間で	day1	
7	生理食塩液1000mL ○フルオロウラシル注	1Bag 800mg/m ²	点滴静注	24時間で	day1	
8	生理食塩液50mL デキサート注6.6mg/2mL	1本 1V	点滴静注	全開で	day2-3	
9	生理食塩液1000mL ○フルオロウラシル注	1Bag 800mg/m ²	点滴静注	24時間で	day2-5	
10	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day5	

その他(減量基準・特記事項など)

コメント:フルオロウラシル (42mL/h)で持続,補液は経過を見て追加。

コメント:RP14 5日目の5-FU持続点滴終了後

変更点 201202

・プロイメント単独にデキサート入りへ(投与時間変更 15分で→30分以上かけて)

・ラシックス削除(マンニトールのみ)

20210520 ソリューゲンG注→アクメインD輸液500mL

20220202 シスプラチンハイドレーション用にソリューゲン・アクメイン追加