

レジメン名	DCF : DOC(35mg/m <sup>2</sup> day1,8)+CDDP(60mg/m <sup>2</sup> day1)+フルオロウラシル(600mg/m <sup>2</sup> day1-5) 4週		
対象癌種	食道癌		
1コースの期間	28日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL デキサート注6.6mg/2mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1V 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1	
2	5%ブドウ糖注射液250mL ○ドセタキセル点滴静注	1Bag 35mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間で	day1	
3	アクメインD輸液500mL 硫酸Mg補正液1mEq/1mL	1Bag 8mL	点滴静注	1時間で	day1	
4	20%マンニトール注射液300mL	1Bag	点滴静注	30分で	day1	
5	生理食塩液250mL ○シスプラチン点滴静注	1Bag 60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間で	day1	遮光袋
6	ソリューゲンF輸液500mL	1Bag	点滴静注	1時間で	day1	
7	アクメインD輸液500mL	1Bag	点滴静注	1時間で	day1	
8	生理食塩液1000mL ○フルオロウラシル注	1Bag 600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間で	day1	
9	生理食塩液50mL デキサート注6.6mg/2mL	1本 1V	点滴静注	全開で	day2-3	
10	生理食塩液1000mL ○フルオロウラシル注	1Bag 800mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間で	day2-5	
11	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day5	
12	生理食塩液50mL デキサート注6.6mg/2mL	1本 1V	点滴静注	全開で	day8	
13	5%ブドウ糖注射液250mL ○ドセタキセル点滴静注	1Bag 35mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day8	
14	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day8	

その他(減量基準・特記事項など)

変更点 201202

・RP1,RP5,RP8 投与時間変更 15分→全開で

変更点 240415

CDDP側管投与→day1本体に組み込む

制吐薬、前投薬他のFPと合わせる

ドセタキセルの溶解液、投与速度変更