

レジメン名	Bmab(5mg/kg)+mFOLFOX6 2週		
対象癌種	大腸がん		
1コースの期間	14日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1	
2	生理食塩液100mL ○ペバシズマブ点滴静注	1本 5mg/kg	点滴静注	90分で	day1	
3	5%ブドウ糖注射液250mL ○オキサリプラチン点滴静注液	1Bag 85mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
4	5%ブドウ糖注射液250mL ○レボホリナート点滴静注用	1Bag 200mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
5	生理食塩液50mL ○フルオロウラシル注	1本 400mg/m2	点滴静注	全開で	day1	
6	生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	
7	生理食塩液100mL ○フルオロウラシル注	1本 2400mg/m2	点滴静注	46時間で	day1	トレフューザーポンプ

その他(減量基準・特記事項など)

コメント1:RP3 60分(2回目)、30分(3回目以降)

コメント2:RP5 側管、オキサリプラチンと並列で同時投与

コメント3:RP6 レボホリナート終了後

コメント4:RP7 トレフューザーポンプ(2.5mL/h)で

○変更(2020/10/29)

①前投薬 デキサート9.9mg→3.3mgへ(中等度オプションのため)

②Bmab後のフラッシュ中止

③5FU メインで

④5FU後の生食追加(ルートフラッシュ用)