

レジメン名	Bmab(5mg/kg)+mFOLFOXIRI 2週		
対象癌種	大腸がん		
1コースの期間	14日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	アロカリス点滴静注用235mg パロセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL デキサート注6.6mg/2mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1V 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1	
2	生理食塩液100mL ○ベバシズマブ点滴静注	1本 5mg/kg	点滴静注	90分で	day1	
3	5%ブドウ糖注射液250mL ○オキサリプラチン点滴静注液	1Bag 85mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
4	5%ブドウ糖注射液250mL ○レボホリナート点滴静注用	1Bag 200mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
5	生理食塩液250mL ○イリノテカン点滴静注	1Bag 150mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
6	生理食塩液100mL ○フルオロウラシル注	1本 2400mg/m2	点滴静注	46時間で	day1	トレフューザーポンプ

その他(減量基準・特記事項など)

コメント1:RP2 60分(2回目)、30分(3回目以降)

コメント1:RP4 側管、イリノテカンと並列で同時投与

○変更(2021/1/13)

①イリノテカンの投与時間は1.5時間→2時間(投与順の統一のため)