

レジメン名	Pmab(6mg/kg)+FOLFIRI 2週		
対象癌種	大腸がん		
1コースの期間	14日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルート確保	day1	インラインフィルター
2	生理食塩液100mL ○ベクティビックス点滴静注用	1本 6mg/kg	点滴静注	60分	day1	インラインフィルター
3	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	インラインフィルター
4	グラニセロン点滴静注パック3mg/100mL デキサート注6.6mg/2mL	1Bag 1V	点滴静注	30分で	day1	
5	5%ブドウ糖注射液250mL ○レボホリナート点滴静注用	1Bag 200mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
6	5%ブドウ糖注射液250mL ○イリノテカン点滴静注	1Bag 150mg/m2	点滴静注	1.5時間で	day1	
7	生理食塩液100mL ○フルオロウラシル注	1本 400mg/m2	点滴静注	全開	day1	
8	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	
9	生理食塩液100mL ○フルオロウラシル注	1本 2400mg/m2	点滴静注	46時間で	day1	トレフューザーポンプ

その他(減量基準・特記事項など)

コメント1:RP4 側管、グラニセロンパックと並列で同時投与

コメント2:RP6 レボホリナート終了後

コメント3:RP8 トレフューザーポンプ(2.5mL/h)で

コメント4:RP6グラニセロン終了後、レボホリナートと並列投与

○変更(2020/10/29)

1デキサート9.9mg→6.6mgに(中等度)

2イリノテカンの溶解液:生食→5%Tzに変更

3 5FUの側管投与の中止

4 5FU後の生食追加(ルートフラッシュ用)

○変更(2022/08/24)

コメント4追加