

レジメン名	Pmab (6mg/kg)+mFOLFOX6 2週		
対象癌種	大腸がん		
1コースの期間	14日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルート確保	day1	インラインフィルター
2	生理食塩液100mL ○ベクティビックス点滴静注用	1本 6mg/kg	点滴静注	60分	day1	インラインフィルター
3	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	インラインフィルター
4	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1	
5	5%ブドウ糖注射液250mL ○オキサリプラチン点滴静注液	1Bag 85mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
6	5%ブドウ糖注射液250mL ○レボホリナート点滴静注用	1Bag 200mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
7	生理食塩液100mL ○フルオロウラシル注	1本 400mg/m2	点滴静注	全開で	day1	
8	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	
9	生理食塩液100mL ○フルオロウラシル注	1本 2400mg/m2	点滴静注	46時間で	day1	トレフューザーポンプ

その他(減量基準・特記事項など)

コメント1:RP5 側管、パロノセトロンと並列で同時投与

コメント2:RP10 2.5mL/h

○変更(2020/7/14)

①硫酸Mg、ファモチジン削除

②制吐薬ガイドラインに従った変更

③5FUの側管投与の中止