

レジメン名	RAM(8mg/kg) + FOLFIRI 2週		
対象癌種	大腸がん		
1コースの期間	14日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液50mL ポララミン注5mg/1mL	1本 1A	点滴静注	全開で	day1	インラインフィルター
2	生理食塩液100mL	1本	点滴静注	30分で	day1	Infusion reaction軽減のため
3	生理食塩液250mL ○サイラムザ点滴静注	1Bag 8mg/kg	点滴静注	1時間で	day1	インラインフィルター Infusion reaction観察必要
4	グラニセロン点滴静注パック3mg/100mL デキサート注6.6mg/2mL	1Bag 1V	点滴静注	30分で	day1	
5	5%ブドウ糖注射液250mL ○レボホリナート点滴静注用	1Bag 200mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
6	5%ブドウ糖注射液250mL ○イリノテカン点滴静注	1Bag 150mg/m2	点滴静注	1.5時間で	day1	
7	生理食塩液100mL ○フルオロウラシル注	1本 400mg/m2	点滴静注	全開	day1	
8	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	
9	生理食塩液100mL ○フルオロウラシル注	1本 2400mg/m2	点滴静注	46時間で	day1	トレフューザーポンプ

その他(減量基準・特記事項など)

コメント1:RP3 忍容性があれば2回目以降30分可

コメント2:RP5 側管、グラニセロンパックと並列で同時投与

コメント3:RP6 グラニセロン終了後、レボホリナートと並列投与

コメント4:RP7 レボホリナート終了後

コメント5:RP9 トレフューザーポンプ(2.5mL/h)で