

レジメン名	ロイコボリン救援MTX大量療法 (MTX: 3.5g/m <sup>2</sup> ) ロイコボリン24時間後		
対象癌種	中枢神経原発性悪性リンパ腫		
1コースの期間	14日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液50mL 注射用ダイアモックス500mg	1本 1V	点滴静注	1日1回	day1-6	
2	メイロン7%20mL ソルデム3A500mL	2A 1Bag	点滴静注	1日2回	day1	
3	グラニセロン点滴静注パック3mg/100mL デキサート注6.6mg/2mL	1Bag 1V	点滴静注	全開で	day2	側管
4	生理食塩液250mL ○メソトレキセート	1Bag 3500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	6時間で	day2	側管
5	メイロン7%20mL ソルデム3A500mL	2A 1Bag	点滴静注	4時間かけて 0:00-4:00	day2-6	
6	メイロン7%20mL ファモチジン20mg ソルデム3A500mL	2A 1A 1Bag	点滴静注	4時間かけて4:00-8:00	day2-6	
7	メイロン7%20mL ソルデム3A500mL	2A 1Bag	点滴静注	4時間かけて 8:00-12:00	day2-6	
8	メイロン7%20mL ソルデム3A500mL	2A 1Bag	点滴静注	4時間かけて 12:00-16:00	day2-6	
9	メイロン7%20mL ファモチジン20mg ソルデム3A500mL	2A 1A 1Bag	点滴静注	4時間かけて16:00-20:00	day2-6	
10	メイロン7%20mL ソルデム3A500mL	2A 1Bag	点滴静注	4時間かけて 20:00-0:00	day2-6	
11	生理食塩液50mL 注射用ダイアモックス500mg	1本 1V	点滴静注	1日1回(5セット)	day1-6	側管より 3時間尿量300mL以下で投与
12	メイロン7%20mL	1A	点滴静注	1日1回(5セット)	day2-6	側管より 3時間毎に尿pH7.0以下で投与
13	生理食塩液50mL ロイコボリン注3mg	1本 5A	点滴静注	30分かけて 1日4回	day3 12:00-day6	

その他(減量基準・特記事項など)

※ダイアモックスは別記録参照

※リツキシマブ入りのレジメンと合わせた内容に