

レジメン名	リツキシマブ併用ロイコボリン救援MTX大量療法 (MTX: 3.5g/m ²)ロイコボリン24時間後		
対象癌種	中枢神経原発性悪性リンパ腫		
1コースの期間	14日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	デキサート注6.6mg/2mL ポラミン注5mg/1mL 生理食塩液50mL	1V 1A 1本	点滴静注	1日1回	day1	
2	生理食塩液100mL	1本	点滴静注	30分で	day1	
3	生理食塩液250mL ○リツキシマブ	1Bag 375mg/m ²	点滴静注	25mL/h	day1	
4	メイロン7%20mL ソルデム3A500mL	2A 1Bag	点滴静注	1日2回	day1	
5	グラニセロン点滴静注パック3mg/100mL デキサート注6.6mg/2mL	1Bag 1V	点滴静注	全開で	day2	側管
6	生理食塩液250mL ○メソトレキセート	1Bag 3500mg/m ²	点滴静注	6時間で	day2	側管
7	メイロン7%20mL ソルデム3A500mL	2A 1Bag	点滴静注	4時間かけて 0:00-4:00	day2-6	
8	メイロン7%20mL ファモチジン20mg ソルデム3A500mL	2A 1A 1Bag	点滴静注	4時間かけて 4:00-8:00	day2-6	
9	メイロン7%20mL ソルデム3A500mL	2A 1Bag	点滴静注	4時間かけて 8:00-12:00	day2-6	
10	メイロン7%20mL ソルデム3A500mL	2A 1Bag	点滴静注	4時間かけて 12:00-16:00	day2-6	
11	メイロン7%20mL ファモチジン20mg ソルデム3A500mL	2A 1A 1Bag	点滴静注	4時間かけて 16:00-20:00	day2-6	
12	メイロン7%20mL ソルデム3A500mL	2A 1Bag	点滴静注	4時間かけて 20:00-0:00	day2-6	
13	生理食塩液50mL 注射用ダイアモックス500mg	1本 1V	点滴静注	1日1回(5セット)	day1-6	側管より 3時間尿量300mL以下で投与
14	メイロン7%20mL	1A	点滴静注	1日1回(5セット)	day2-6	側管より 3時間毎に尿pH7.0以下で投与
15	生理食塩液50mL 注射用ダイアモックス500mg	1本 1V	点滴静注	1日1回(5セット)	day1-6	
16	生理食塩液50mL ロイコボリン注3mg	1本 5A	点滴静注	30分かけて 1日4回	day3 12:00-day6	生理食塩液10mLで溶解 3mL使用全量43mL

その他(減量基準・特記事項など)

RP1: 投与前にアセトアミノフェン500mg内服

RP2: 初回25mL/hで1時間→100mL/hで1時間→以後150mL/hで 初回忍容性あれば100mL/hより開始

RP4: リツキシマブ投与後、day2 0:00まで 残液は破棄