

レジメン名	【遺伝多形有】nal-IRI(オニバド <sup>®</sup> 50mg/m <sup>2</sup> )+FL 2週		
対象癌種	膵がん		
1コースの期間	14	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	器具
1	大塚生食注100ml デキサート注6.6mg/2ml デキサート注1.65mg/0.5ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml 「タイホウ」	1本 2A 1瓶 1瓶	点滴静注	全開で	day1	
2	大塚糖液5% 500ml ○オニバド点滴静注用	1Bag 50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分で	day1	
3	大塚糖液5%250ml ○レボホリナート点滴静注用	1Bag 200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間で	day1	
4	生理食塩液100ml ○5FU注	1Bag 2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間で	day1	インフューザーポンプ
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

その他(減量基準・特記事項など)

メモ: UGT1A1\*6orUGT1A1\*28のホモ接合体を有する患者、  
又はUGT1A1\*6及びUGT1A1\*28のヘテロ接合体を有する患者対象

コメント1:RP3 メインで投与

コメント2:インフューザーポンプで2.5ml/h